



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI
TROPICALE

„DR. VICTOR BABEȘ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax:
317.27.21

web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEȘ”
BUCUREȘTI


Șos. MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr. 1631

Tip 04 Luna 02 2015

Aprobat Manager
Dr Emilian Ioan Imbri

PROTOCOL RESUSCITARE COPIL



ÎN TIMPUL RCP

- RCP de calitate: frecvență, compresuni, decompresuni
- Planificați acțiunile înainte de întreruperea RCP
- Administrați oxigen
- Acces vascular (intravenos, intraosos)
- Adrenalină la 3-5 minute
- Protejarea căilor aeriene și capnografie
- Continuați compresiunile toracice după protejarea căii aeriene

CAUZE REVERSIBILE

- Hipoxia
- Hipovolemia
- Hipo/Hiperpotasemia/Dezechilibre metabolice
- Hipotermia
- Pneumotorax în tensiune
- Toxice
- Tamponada cardiacă
- Tromboembolism



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI
TROPICALE

„DR. VICTOR BABEȘ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax:
317.27.21

web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



- Corecțai cauzele reversibile

Raportul compresii/ventilații

Se recomandă ca în situația în care este doar un singur salvator să se practice RCR cu un raport 30:2 (ca la adult). În cazul în care sunt doi sau mai mulți salvatori se va practica RCR cu un raport 15:2

Masajul cardiac extern

La sugar MCE se practică cu două degete în cazul unui singur salvator iar dacă sunt doi se practică folosind ambii polici (58-59). La copilul mai mare de un an se practică MCE folosind una sau ambele mâini.

Defibrilarea electrică automată

Studii recente au arătat că defibrilatoarele electrice automate sunt capabile să evalueze corect ritmul cardiac la copii și extrem de rar ar putea să recomande incorect administrarea unui șoc. Conform noilor ghiduri de resuscitare se recomandă administrarea șocurilor la copiii mai mari de un an (4J/kgc). Pentru administrarea șocurilor se recomandă folosirea padelelor pediatrice în cazul copiilor între 1 și 8 ani (se pot folosi și padelele pentru adulți în cazul în care nu sunt disponibile cele pentru copii).

În cazul copiilor mai mari de 8 ani se folosește protocolul de la adulți.

Intocmit

Dr Delia Stanciu

Medic primar ATI

Director Medical

Dr Florescu Simin Aysel