



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE
„DR. VICTOR BABEŞ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21
web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEŞ”
BUCUREŞTI

Șos MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr.1631.....

Ziua...04.....Luna...02.....20.....15

MENINGITA LEPTOSPIROTICA

Aprobat Manager

Dr. Emilian Ioan Imbri



I. CONDITII SPITALIZARE

- Orice suspiciune de meningite

II. Analize

- Uzuale (HLG, VSH, CREATININA, TGP) – la internare, la externare, ± la nevoie
- CRP
- Ionograma(Na, K, Cl) – la internare, apoi cat de frecvent este nevoie (chiar si zilnic)
- Exsudate (faringian, nazal)
- Punctie lombara(examen LCR- ex macroscopic, bacteriologie (Pandy, elemente, froturi gram, giemsa, culturi), biochimie
- Ac anti HIV
- Serologie leptospire
- ± EEG

Consulturi interdisciplinare: ORL, Neurologie, Neurochirurgie, altele dupa caz

Tratament

1. Antibiotic:

- Ampicilina 200mg/kgc/zi, in 4 prize, 10 zile

Sau

- Penicilina G 8-12 mil UI, in 4 prize, 10 zile

Sau

- Cef3, 10 zile

2. Tratament patogenic:

- Depletive cerebrale: Manitol 20% 5 - 10ml/kgc/zi ± Furosemid 1mg/kgc/zi (daca sunt semne de HIC)
- Corticosteroid: Dexametazona 0,4mg/kgc/zi , 3-5 zile
- Corectarea diselectrolitemiilor cu solutii molare de KCl, NaCl
- Antitermice(Perfalgan 1,5ml/kgc X 3 – 4/zi/ Ibuprofen/ Algocalmin)
- Protectoare gastrice: Ranitidina/Nexium, Dicarbocalm
- ± Anticonvulsivante(Diazepam, Fenitoina, Fenobarbital injectabil, Depakine) daca apar convulsii

Intocmit

Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor

Utilizarii ghidurilor si protocoalelor de practica

Președinte Dr Florescu Simin Aysel

Director Medical
Dr Florescu Simin Aysel