



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE
„DR.VICTOR BABEŞ”

Sos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21
web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEŞ”
BUCUREŞTI

Sos. MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr. 16/20

Ziua..... 04 Luna..... 01 An..... 2015

Aprobat Manager

Dr. Emilian Ioan Imbri



MENINGITA VIRALA

I. CONDITII SPITALIZARE

Orice suspiciune de meningita

II. DIAGNOSTIC

Analize

1. Uzuale : HLG, VSH, CREATININA, CRP)
2. Punctie lombara (examen LCR- ex macroscopic, bacteriologie (Pandy, elemente, frotiuri Gram, Giemsa, culturi), biochimie
3. Investigatii virusologice/imunologice din LCR in functie de contextul epidemiologic
4. Serologii specifice (West Nile, HSV, enterovirusuri, etc)
5. Ac anti HIV
6. ± RMN
7. ± EEG

Consulturi interdisciplinare: ORL, Oftalmologie, Neurologie, Neurochirurgie, etc

III. TRATAMENT

1. Fara tratament etiologic

Exceptie: Meningita herpetica:

- Aciclovir injectabil 10 mg/kg/doza – 1 doza la 8 ore i.v, 10-14 zile

2. Tratament patogenic:

- Depletive cerebrale: Manitol 20% 5 -10ml/kgc/zi ± Furosemid 1mg/kgc/zi (daca sunt semne de HIC)
- Corticosteroid: Dexametazona 0,4mg/kgc/zi /AINS– in edem cerebral important sau in hiperalbuminorahie, 3-5 zile
- Corectarea diselectrolitemiilor cu solutii molare de KCl, NaCl
- Neurotrope– vit B1, vit B6 (± Piracetam daca exista modificari neurologice)
- Antitermice (Perfalgan 1,5ml/kg X 3 – 4 doze, Ibuprofen, Algocalmin)
- Protectoare gastrice: Ranitidina/Nexium, Dicarbocalm
- ± Anticonvulsivant: Diazepam (injectabil sau Desitine) sau Fenobarbital injectabil sau Fenitoin ori Acid valproic(Depakine) - daca apar convulsiile

Monitorizare clinic+PL !

Intocmit

Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor

Utilizarii ghidurilor si protocoalelor de practica

Președinte Dr Florescu Simin Aysel

Director Medical
Dr Florescu Simin Aysel