



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE

„DR.VICTOR BABES”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21
web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEŞ” BUCUREŞTI

Şos. MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr. 1639

Ziua... 09 Luna... 02 ... An... 15

MENINGITA TBC

Aprobat Manager

Dr. Emilian Ioan Imbri



I. CRITERII INTERNARE:

-orice suspiciune meningita TB.

II. Analize

1. Uzuale: HLG, VSH, creatinina, TGP, TGO, CRP, ionograma (Na, K, Cl), sumar urina – la internare
2. Punctie lombara(examen LCR - ex macroscopic, bacteriologie (Pandy, elemente, frotiuri gram, Giemsa, Ziehl-Nielsen, culturi, val pentru b.k.), biochimie , PCR BK din LCR
3. Hemoculturi BK (cand nu avem un sediu primar de infectie)
- 4.Aspirat gastric (frotiu Ziehl-Nielsen si culturi BK)
5. Bronhoscopie cu lavaj
6. IDR la PPD
- 7.Rg pulmonara pacient + insotitor(la copii)
9. RMN cerebral
- 10.± EEG (mai ales la copii)


Consulturi interdisciplinare: ORL, neurologie, neurochirurgie, pneumologie, cardiologie, oftalmologie.

III. Tratament

→ *Copii:*

1. Etiologic 7/7 X 2 luni:

- Izoniazida 5 mg/kgc/zi
- Rifampicina 10 mg/kgc/zi
- Pirazinamida 25 mg/kgc/zi
- Streptomicina 15 mg/kgc/zi



Apoi: Etiologic 7/7 X 6 - 8 luni

- Izoniazida 5 mg/kgc/zi
- Rifampicina 10 mg/kgc/zi

→ *Adulti:*

Etiologic 7/7 2 luni

- HIN 300 mg/zi
- PZM 1,5g/zi
- RMP 600 mg/zi
- EMB1,2 g/zi

Apoi Etiologic inca 6-8 luni:

- HIN+RMP 3/7





2. Patogenie și simptome

1. Depletive cerebrale: Manitol 20% 5 -10ml/kgc/zi ± Furosemid 1mg/kgc/zi (daca sunt semne clinice de HIC)
2. Corticosteroid: Dexametazona 0,4mg/kgc/zi , o luna sau pana la normalizarea albuminorahiei.
3. Corectarea diselectrolitemiilor cu solutii molare de KCl, NaCl
4. Neurotrope – vit B1, vit B6 (± Piracetam daca exista modificari neurologice)
5. Antitermice (Perfalgan 1,5ml/kg X 3 – 4 doze/ Ibuprofen /Algocalmin)
6. Protectoare gastrice: Ranitidina/Nexium, Dicarbocalm
7. ± Anticonvulsivant: Diazepam (injectabil sau Desitine) sau Fenobarbital injectabil sau Fenițoin ori Acid valproic(Depakine) - daca apar convulsiile

Durata spitalizării: 6-8 săptămâni

Intocmit

Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor

Utilizarii ghidurilor și protocoalelor de practica

Președinte Dr Florescu Simin Aysel

Director Medical
Dr Florescu Simin Aysel