



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEȘ”

BUCUREȘTI

Șos. MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr. 1631

04 Luna 02 2015



Aprobat Manager  
Dr. Emilian Ioan Imbri

## ANTIBIOTERAPIA PROFILACTICĂ ÎN SERVICIILE DE PNEUMOLOGIE PROTOCOL CLINIC

Profilaxia antibiotică în serviciile de pneumologie nu are decât o singură indicație conform Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT), și anume tuberculoza latentă.

**Tratamentul TB latente** se referă la persoanele cunoscute a fi infectate cu *Mycobacterium tuberculosis* dar care nu sunt bolnave de tuberculoză. Acesta nu este recomandată de rutină, având în vedere problemele ridicate: necesitatea excluderii tuberculozei ca boală, necesitatea asigurării compliancei la tratament, numărul mare de persoane infectate, costurile și personalul necesar, evidența acestor cazuri, etc.

### Indicațiile tratamentului TB latente

Factorul de risc	Rezultatul reacției cutanate la PPD
Contacti în vârstă de până la 19 ani ai pacienților cu TB pulmonară cu microscopie pozitivă	$\geq 10$ mm
Infecția HIV și bolnavi cu afecțiuni cronice cu risc important de imunodepresie	$\geq 5$ mm

Înainte ca acești pacienți să fie tratați, se va efectua o anamneză atentă, examen clinic și radiografic pentru excluderea unei TB active și pentru obținerea de informații asupra chimiosusceptibilității MT a sursei de infecție.

**Regimul standard** folosit: cu H, 5 mg/kgc (max.300mg) la adult, 10 mg/kgc la copii, în administrare zilnică, timp de 0-9 luni (12 luni la HIV+).

Tuberculoza latentă se tratează mai rar în serviciile cu paturi, de regulă tratamentul ei se face în ambulator.

Intocmit

Dr Olimpia Nicolaescu

Medic Primar Pneumolog

Director Medical  
Dr Florescu Simin -Aysel